


La lutte contre le poux rouge



Andermatt BioVet est une entreprise familiale Suisse. Nous nous sommes fixés comme objectif, d'apporter aux éleveurs de réelles alternatives à la médecine conventionnelle, pour encourager la santé animale, le bien-être de l'Homme, de l'animal et de la nature.




Généralement

- Survie (sans nourriture): jusqu'à 9 mois par 5 °C
- Actifs la nuit, vivent cachés durant la journée
- Leur développement dépend beaucoup de la température



Présence des poux rouges

- Dans les fentes, fissures, angles et bordures
- Sous les perchoirs
- Aux endroits de pontes
- Dans la litière



**Le summum de l'iceberg étant
l'infestation visible.**

Schadwirkung


- des restrictions du bien-être de la santé animale
- baisse de la ponte
- diminution de la qualité de l'oeuf
l'anémie et même la mortalité



Concept:

Notre concept: un système pour deux niveaux

- Niveau 1: Infestation préventive à faible
- Niveau 2: Infestation modérée à forte



Niveau 1: Infestation préventive à faible: acarien prédateur

Le put:

- Un équilibre entre prédateurs et parasites

ANDROLIS®:



- 3 – 4 introductions

TAURRUS®:



- 1–2 introductions

Niveau 1: Infestation préventive à faible: acarien prédateur

La mise en place: au plus tard au printemps dès l'apparition des premiers poux rouges.

La quantité d'acariens prédateurs à introduire se fait en fonction du nombre de poules, de la taille et du taux d'infestation du poulailler




ACARIEN PRÉDATEUR

TAURRUS®



TAURRUS®

- 0,5 mm petit – difficile visiblement
- Manges toutes les stades (oeuf et larves)
- Existes que des femelles
- Reproduction: 14 jours à 28 °C



ACARIEN PRÉDATEUR


ANDROLIS®



ACARIEN PRÉDATEUR

ANDROLIS®

- 1 mm petit – bien visiblement
- Manges tout les stades (préférence pour les nymphes)
- Existes des femelles et des mâles
- Reproduction: 14 jours à 25 °C



ACARIEN PRÉDATEUR

TAURRUS® lâcher



- En combinaison avec ANDROLIS® nous recommandons d'introduire TAURRUS® 1–2 fois du printemps à l'automne par intervalles de 12 –16 semaines.
- TAURRUS® se prêtent dans les zones sèches du poulailler, les nids à pontes, sur les caillebotis en bois et dans les litières.



ACARIEN PRÉDATEUR

ANDROLIS® lâcher



- Les épandeurs sont à changer après 6 – 8 semaines.
Nous conseillons au moins 3 – 4 introductions par saison (du printemps à l'été)
- Nous recommandons en plus de ANDROLIS® au moins une introduction complémentaire de TAURRUS®



ACARIEN PRÉDATEUR

produits en combinaison:

- **Seulement ponctuellement:**

- InsectoSec-Spray
- Bio-Phalanx Insektenspray
- Savon noir

- **directement sur la poule:**

- Dermafree
- Dermapulsif



Poudre aux extraits de plantes

Dermapulsif est administré à travers la nourriture:

- Les extraits de plantes protègent en rendant le sang des poules pour les poux rouges peu attractif




Application/Dosage

- Petit poulailler (pour récipient de 800 g):
- 5 g Dermapulsif pour 10 kg de nourritures.
- Utilisez Dermapulsif en continu pendant au moins 30 jours. Puis arrêter le traitement pour 10 jours. Ce rythme est renouvelé en respectant l'application pour toute la saison du printemps à l'automne.



Dermafree c'est quoi?

À administrer à travers les abreuvoirs. Dermafree est à base d'extraits végétaux qui rendent le sang des poules imbuvable pour les poux rouges.



Application/Dosage

Petit poulailler: 1 ml pour 1 litre d'eau pendant 7 jours. Puis durant 10 semaines 1 fois par semaine 1 ml pour 1 litre d'eau.



Dermapulsif/Dermafreet

Pour les poules les deux produits n'ont aucuns effets négatifs sur la ponte, l'engraissement ou le goût



Niveau 2: Infestation modérée à forte: Gallo-Sec

Gallo-Sec c'est quoi:

Substance actif: 100% terres de diatomées

Effet:

Poudre naturelle de terre de diatomées fossile



Gallo-Sec dosage

- **Application sèche:** Répartir 30 – 50 g Gallo-Sec uniformément dans le poulailler à l'aide d'un di useur de poudre, pistolet aspirantsouant
- **Application liquide:** Nous recommandons en fonction de l'infestation 150 ml à 200 ml de Gallo-Sec dans 1 litre d'eau. Difusez avec un pulvérisateur manuel ou avec un pulvérisateur dorsal.



Résumé

Contrairement aux méthodes conventionnelles, nos méthodes naturelles pour endiguer les poux rouges ne nécessite aucun délai d'attente et ne cause pas de troubles de santé pour l'utilisateur. De plus, il y a **nul risque d'infestation des oeufs** ou d'apparition de résistances.





Merci beaucoup
