



www.ziergefluegel.shop
www.antshop.ch



Alte Kerenzerstrasse 37 • 8758 Obstalden • info@ziergefluegel.shop

Anwendung der Raubmilben im Hühnerstall

Einführung

Dutchy's® sind **Raubmilben** aus der Familie Laelapidae, die in großen Teilen Europas in der freien Natur vorkommen. Sie leben im Boden und jagen dort unterschiedliche Bodenorganismen. Wenn diese Raubmilben in den Käfigen ausgesetzt werden, bekämpfen sie Schädlinge, u. a. die Blutmilben. Sie jagen die Schädlinge den ganzen Tag, töten sie und verspeisen sie anschließend. Es ist nur eine Frage der Zeit; die Raubmilben werden aus dem Kampf fast immer als Gewinner hervorgehen.



Raubmilben die **biologische** Bekämpfung von Vogel- / Blutmilben!

Beschreibung der Raubmilben

Grösse: ca. 1 mm

Form: tropfenförmig

Farbe: hellgrau / beige

Entwicklung: nach einigen Tagen schlüpfen die Raubmilben aus den abgelegten Eiern. Sie häuten sich einige Male bis sie erwachsen sind.

Temperatur: optimal ist 15 bis 28°C bei höherer oder tieferer Temperatur machen sie eine Ruhepause. Bei Frost sterben sie ab.

Ernährung: Sie ernähren sich von verschiedenen Organismen, wie z. B. Larven kleiner Mücken, Springschwänzen und verschiedenen Arten von Milben, worunter auch die **Blutmilben** fallen.

Jede Raubmilben verspeist pro Tag im Durchschnitt 5 Blutmilben.

Besonderes der Raubmilben

- Die Raubmilben gehen **nicht** auf die Hühner (Tiere) da sie sich von Kleinstlebewesen wie Milben ernähren und **kein** Blut saugen
- **Biologische** Bekämpfung der Blutmilben
- **Keine** Rückstände in den Erzeugnissen
- **Keine** Belastung der Umwelt

Raubmilben und Produkte für die Ausbringung

Flaschen in drei Grössen:

Raubmilben Flasche 2'500 Stück



Raubmilben Flasche 5'000 Stück



Raubmilben Flasche 10'000 Stück



Ausbringung:

Ausbringungsbehälter



Befeuchtungsmatten



oder die Alternative:

Raubmilben Booster Patrone 2'500 Stück



info@ziergefluegel.shop

Halter zu Booster Patrone



www.ziergefluegel.shop

Kontrolle im Stall oder in der Voliere

Kontrollröhrchen 5 Stück



wenig Befall



mittlerer Befall



extremer Befall



Zu beachten vor der Ausbringung der Raubmilben

- Minimum Temperatur im Stall über 14°C
- Vor der Ausbringung sollte der Stall sauber gereinigt werden!
- Nicht oder nur wenig einstreuen!
- Es darf kein Gift oder andere Mittel gegen Milben eingesetzt werden, da die Raubmilben von diesem auch sterben!

Orte für die Ausbringung der Raubmilben

Nr. 1 Sitzstangen

Nr. 2 Legenester / Nistplätze

Nr. 3 im Stall an stellen wo es viele Milben hat

Ausbringung der Raubmilben

mit Ausbringungsbehälter und Matte

befüllen vom Behälter



anbringen an Sitzstange oder Voliere



aufbringen auf Matte



- Mischen mit Blumenerde gemäss Anwendungsart
- Regelmässige Kontrolle der Feuchtigkeit vom Substrat. Es darf nicht austrocknen da sonst die Eier nicht mehr schlüpfen.

Ausbringung der Raubmilben

mit Booster

anbringen an Voliere



Booster Patrone mit Halter



anbringen an Sitzstange



Anwendungsdauer

- Die Dosierung ist für 5 – 6 Wochen
- Nach 5 – 6 Wochen müssen die Behälter entleert werden, da sich sonst die Blutmilben einnisten und vermehren
- Falls nötig nochmals befüllen oder Booster Patrone tauschen
- Eine Überdosierung ist nicht möglich, da die Raubmilben sterben wenn sie kein Futter (Milben und Kleinstlebewesen) mehr finden

Weitere Anwendungen der Raubmilben

Neben den Blutmilben können auch noch weitere Milben mit unseren Raubmilben bekämpft werden.

- **Tropische Vogelmilben**
- **Varroamilben**
- **Milben in Terrarien**

Raubmilben

Die **biologische** Bekämpfung von Milben bei Ihren Tieren!

Für gesunde Tiere die lange leben.



www.ziergefluegel.shop
www.antshop.ch



Alte Kerenzerstrasse 37 • 8758 Obstalden • info@ziergefluegel.shop

Danke für Ihre Aufmerksamkeit